Амелотекс®: надежное средство от боли в суставах и мышцах

Февральские холода вновь спровоцировали обострение хронических заболеваний костно-мышечной системы, основной симптом которых – ноющая и неотпускающая боль в суставах и мышцах. Клиническая практика показала: оптимальным решением проблемы является терапия с использованием отечественного препарата Амелотекс®.

В России, по данным Минздравсоцразвития, ежегодно регистрируется более 10 млн взрослых пациентов с заболеваниями костно-мышечной системы.

Вне зависимости от этиологии, развитие боли при этих заболеваниях тесно связано с процессами тканевого воспаления (локального или системного) и сопровождается гиперэкспрессией ЦОГ-2 и выбросом противовоспалительных простагландинов. Поэтому основной и важнейшей группой препаратов для патогенетической терапии боли при заболеваниях опорно-двигательного аппарата являются нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП).

В Европе этот класс фармакологических агентов в поликлинической практике назначают 82% врачей общей практики и 84% ревматологов, а в стационаре их применяют около 20% больных.

Основной функцией НПВП является подавление воспалительного процесса или существенное снижение его интенсивности. Кроме того, они обладают выраженным анальгезирующим и антипиретическим действиями: уменьшают боли, улучшают кровоснабжение и подвижность суставов и позвоночника, что, в свою очередь, приводит к улучшению качества жизни. Поэтому НПВП широко используют при лечении воспалительных и дегенеративных заболеваний суставов и позвоночника; диффузных заболеваниях соединительной ткани, микрокристаллических артропатиях, болезнях внесуставных мягких тканей, большой группе заболеваний, сопровождающихся болями в нижней части спины, остеопорозе и других заболеваниях костей. Среди НПВП, применяющихся для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, особое место занимает препарат Амелотекс® производства отечественной компании «Сотекс».

ВОЗМОЖНОСТЬ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, ПРОЛОНГИРОВАННЫЙ ЭФФЕКТ

Амелотекс® (МНН-мелоксикам) относится к классу оксикамов – производных энолиевой кислоты. Доказано, что Амелотекс® селективно ингибирует ферментативную активность ЦОГ-2, подавляя синтез провоспалительных простагландинов в области воспаления в большей степени, чем физиологических простагландинов. Демонстрируя выраженные противовоспалительный, жаропонижающий и анальгезирующий эффекты, препарат не оказывает повреждающего действия на желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистую систему и функцию почек, что важно для людей, вынужденных использовать лекарственное средство регулярно.

70% жителей планеты испытывают в течение жизни острую боль в нижней части спины

10% жалуются на хронические боли, связанные с дорсопатиями

1,5% страдают хроническими заболеваниями суставов и позвоночника



Сравнительно недавно появившись в России, Амелотекс® сегодня является одним из самых востребованных препаратов для терапии патологий костно-мышечной системы. Использование Амелотекса® существенно улучшает прогноз и течение заболевания, значительно повышает качество жизни.

Мелоксикам (Амелотекс®) в организме не вступает во взаимодействие с другими медикаментами, включая цитостатики, диуретики, сердечные гликозиды, бета-блокаторы и другие, что имеет большое значение для рациональной терапии больных с сопутствующими (коморбидными) заболеваниями. Высокая клиническая эффективность мелоксикама отмечалась у больных ревматоидным артритом, анкилозирующим спондилитом, стеоартрозоми многих других.

Доказательная база основана на многочисленных рандомизированных плацебо-контролируемых исследованиях, в которых эффективность мелоксикама и его переносимость сравнивались с плацебо и основными НПВП: ЦОГ-селективными и ЦОГ-неселективными. Длительность терапии в этих исследованиях составляла от 4 недель до 18 месяцев. Существенное улучшение, которое наступало спустя 2 недели от начала терапии мелоксикамом, колебалось в течение 18 месяцев, т.е. всего периода наблюдения. По своей эффективности мелоксикам не уступал диклофенаку, напроксену и пироксикаму.

Заслуживают внимания результаты лечения мелоксикамом больных анкилозирующим спондилитом, полученные при 12-месячном применении препарата. По своей терапевтической активности 15 мг мелоксикама оказывали такое же действие, как 20 мг пироксикама, а дальнейшее повышение суточной дозы до 22,5 мг/сут) не сопровождалось нарастанием его антивоспалительного и анальгетического эффектов. Эти и другие проведенные исследования подтвердили целесообразность применения препарата Амелотекс® при лечении пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Исследователи отмечали не только высокую клиническую эффективность, но и хорошую его переносимость у обследованных больных.

УДОБСТВО ФОРМЫ И БЫСТРОТА ДЕЙСТВИЯ БЕЗ ПОТЕРИ В КАЧЕСТВЕ

Амелотекс® выпускается в виде раствора для инъекций (одна 1,5 мл ампула препарата содержит 15 мг активного вещества – мелоксикама) и таблеток. Важно отметить, что Амелотекс® является первым зарегистрированным в России дженериком мелоксикама в инъекционной форме. Такая форма выпуска обусловлена тем, что для борьбы с болевым и противовоспалительным синдромами при остеоартрозе и ряде других заболеваний костно-мышечной системы предпочтителен внутримышечный способ введения лекарственного препарата – как быстродействующий, с одной стороны, так и оказывающий минимальное побочное воздействие на ЖКТ, с другой.

Препарат следует вводить глубоко внутримышечно по 7,5–15 мг, один раз в сутки. Максимальная доза – 15 мг/сут. Таблетированные формы препарата следует принимать во время еды. При ревматоидном артрите препарат назначают по 15 мг/сут. При достижении положительного терапевтического эффекта доза может быть снижена до 7,5 мг/сут. При остеоартрозе суточная доза составляет 7,5 мг, при необходимости ее повышают до 15 мг. При анкилозирующем спондилите препарат назначают в дозе 15 мг/сут. Максимальная суточная доза – 15 мг.

Начальная суточная доза у пациентов с повышенным риском побочных эффектов не должна превышать 7,5 мг/сут. При незначительном или умеренном снижении функции почек (КК>25 мл/мин) коррекции дозы не требуется. У пациентов с тяжелой почечной недостаточностью, находящихся на гемодиализе, максимальная доза – 7,5 мг/сут.

Печеночная или почечная недостаточность средней степени тяжести существенного влияния на фармакокинетику мелоксикама не оказывает. ■

/ Фото: www.shutterstock.com /

/ Ирина Смирнова /